

КОРСИКО®ФИТОСОРБ

Комплексный адсорбент микотоксинов с фитобиотиком для с-х. животных

Состав: диатомит, бентонит, цеолит, клеточная стенка дрожжей, композиция эфирных масел.

Применение: Кормовая добавка для эффективной нейтрализации полярных и неполярных микотоксинов, а также алкалоидов спорыньи. Действует благодаря присутствию в составе минеральной (алюмосиликаты), органической (клеточная стенка дрожжей) и фито- (эфирное масло орегано) составляющей. Обладает высокой избирательной способностью к связыванию и биотрансформации токсинов во всех отделах желудочно-кишечного тракта с исключением адсорбции витаминов, минералов и аминокислот. Оказывает антиоксидантное действие на слизистую оболочку кишечника, подавляет рост патогенной и условно-патогенной микрофлоры, снимает иммуносупрессию. Препятствует проникновению микотоксинов и их метаболитов в молоко у коров.

Микотоксикозы – это отравления, возникающие в результате поедания животными кормов, содержащих токсичные метаболиты, выделяемые плесневыми грибами. Микотоксины вырабатываются несколькими видами микроскопических грибов: Aspergillus, Fusarium, Penicillium. При отравлениях в организме нарушается проницаемость мембран, деятельность нервной, гуморальной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, воспроизводительной и др. систем. К наиболее распространенным микотоксикозам у крс относятся поражения афлатоксинами, Т-2, ДОН, охратоксинами, фуманизинами, зеараленоном. Токсины накапливаются в зерновых в процессе вегетации и хранения; в сене, соломе, силосах и сенажах при неправильной заготовке и хранении. Микотоксины даже в очень малых дозах вызывают подавление иммунитета (иммуносупрессию), в несколько больших дозах – снижение молочной продуктивности и привесов, нарушение воспроизводительной функции, вызывают аборт, увеличивают сервис-период. Иммуносупрессия значительно снижает эффективность вакцин, увеличивается заболеваемость животных диареями, маститами, эндометритами, болезнями копыт. При дальнейшем накоплении в организме микотоксины вызывают поражение почек, селезенки, нервной системы, бесплодие и даже гибель животного.



Фитобиотик (*Origanum vulgare*) содержит в своем составе тимол, карвакрол, линалол, дубильные вещества, витамины А, Д, Е, микроэлементы.

Обладает следующими свойствами:

- антимикробными, антибактериальными (бактерицидное действие обеспечивает кишечный и общий активный иммунитет);
- антиоксидантными (повышение свободнорадикальной активности фагоцитов через активацию их ферментативного аппарата);
- стимулирующими пищеварение (улучшает перистальтику кишечника, повышая тонус гладкой мускулатуры, а также отток желчи). Одновременно способствует росту полезной микрофлоры в рубце. У молодняка -увеличение всасывающей поверхности капилляров, рост ворсинок кишечника;

- вкусовыми (повышает привлекательность рациона, влияет на вкусовые рецепторы, усиливает солевацию);
- антистрессовыми - способствует сохранению надоев в жару;
- акарицидными, антикокцидийными (снижается токсичное воздействие паразитов (кокцидии и др.). Быстрая регенерация эпителия слизистой оболочки ЖКТ.

Сорбционная емкость КОРСИКО®ФИТОСОРБ:

| | | | |
|---------------|-----|------------------|-----|
| Афлатоксин В1 | 98% | Афлатоксин В2 | 98% |
| Афлатоксин G1 | 98% | Афлатоксин G2 | 98% |
| Афлатоксин М1 | 87% | Т2 токсин | 92% |
| Охратоксин | 94% | Зеараленон | 96% |
| Цитринин | 90% | Вомитоксин (ДОН) | 92% |
| Фумитоксин | 91% | Фумонизин | 97% |

Применение:

- При контаминации кормов микотоксинами.
- При отравлении вредными и опасными веществами (тяжелыми металлами, бактериальными токсинами), устраняет негативные последствия токсикозов печени.
- КОРСИКО®ФИТОСОРБ разрушает ряд микотоксинов и эндотоксинов, переводя их в неактивную форму.
- В качестве вспомогательного средства для лечения острых кишечных заболеваний.
- Способствует увеличению потребления корма. Фитоэкстракт проявляет антибактериальную активность, противовоспалительный эффект, оказывает стимулирующее действие на иммунную систему, понижает количество соматических клеток в молоке.

Норма ввода:

Коровы дойные, сухостойные:

профилактика – 15–25 г/гол/сут; лечение – 30–50 г/гол/сут.

Телята от 1 до 6 мес. возраста: 5–10 г/гол/сут.

Телята старше 6 мес. возраста: 10–15 г/гол/сут. или 2,0-5,0 кг на 1 т комбикорма.

Для птиц, свиней, кроликов: 0,5-3,0 кг на 1 т комбикорма в зависимости от степени поражения микотоксинами.

Добавку вводят в комбикорма, размол зерна, кормовые смеси при их приготовлении в миксере или поверх розданных кормов. После применения КОРСИКО®ФИТОСОРБ продукцию животноводства можно использовать без ограничений.

Форма выпуска: препарат выпускают в форме порошка.

Упаковка: бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, 40кг

Срок годности: 12 мес со дня изготовления.