ООО «Агрокурсив»
ИНН/КПП 7704367015/770401001
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр.1, помещ. 553 М
Тел 8 800 707 26 88 www.agrokursiv.ru

ПРЕСТАРТЕР АК

Гранулированный полноценный комбикорм для телят с 4-го дня жизни

Состав: *кукуруза, пшеница, шрот соевый, шрот и жмых подсолнечный, дрожжи кормовые, масло растительное, премикс витаминно-минеральный, мел кормовой, натрия хлорид, ароматизатор, ферментный комплекс, фитобиотик, подсластитель.*

Правильное кормление теленка с первых дней жизни важно как для физиологического развития, стимуляции рубцового пищеварения, формирования иммунитета, так и для более быстрого перехода в продуктивную стадию. В этот период теленок испытывает повышенную потребность в питательных веществах–белке, энергии, минералах и витаминах.

ПРЕСТАРТЕР АК производства ООО «Агрокурсив» имеет ряд преимуществ:

Питательность	Ед. изм.	На нативную влажность, не менее
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	МДж/Кг	12,9
СУХОЕ ВЕЩЕСТВО	%	89,1
СЫРОЙ ПРОТЕИН	%	22,0
ПЕРЕВАРИМЫЙ ПРОТЕИН	%	17,9
СЫРОЙ ЖИР	%	4,3
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	%	5,3
СЫРАЯ ЗОЛА	%	2,9
САХАР	%	4,2
КРАХМАЛ	%	31,4
ЛИЗИН	%	1,01
МЕТИОНИН	%	0,37
ТРЕОНИН	%	0,81
ТРИПТОФАН	%	0,27
Ca	%	0,77
P	%	0,75
P УСВОЯЕМЫЙ	%	0,36
Mg	%	0,21
S	%	0,16
K	%	0,79
Na	%	0,19
Cl	%	0,28
NaCl	%	0,46
ВИТАМИН A	Тыс. МЕ/кг	20,0
ВИТАМИН D3	Тыс. МЕ/кг	4,0
ВИТАМИН E	мг/кг	25,0
ВИТАМИН B1	мг/кг	3,0
ВИТАМИН B2	мг/кг	10,0
ВИТАМИН B3	мг/кг	20,0
ВИТАМИН B4	мг/кг	100,0
ВИТАМИН B5 (ниацин)	мг/кг	10,0
ВИТАМИН B12	мг/кг	0,02
ВИТАМИН C	мг/кг	30,0
Fe	мг/кг	50,0
Cu	мг/кг	12,0
Zn	мг/кг	70,0
Mn	мг/кг	50,0
Co	мг/кг	2,5
I	мг/кг	1,5
Se	мг/кг	0,5

1. Не содержит отрубей, мучек, зерноотходов. Основные источники протеина (соя, подсолнечник, дрожжи) имеют хороший аминокислотный профиль.

2. Диаметр гранулы 4 мм, длина 10-12 мм.

3. Полностью обеспечивает потребности растущего теленка в витаминах, макро-и микроэлементах, что позволяет обеспечить интенсивный рост и правильное развитие костяка, паренхимы.

4. Благодаря ферментному комплексу (фитаза+глюканаза+ксиланаза+целлюлаза) повышается доступность и переваримость как растительных компонентов рациона, так и молока.

5. Пониженное содержание сырой золы исключает повышение буферной емкости корма, что снижает риски развития патогенной микрофлоры в ЖКТ.

6. Специальная фитодобавка, содержащая экстракт орегано, корицы и перца, снижает pH содержимого ЖКТ, увеличивают выработку ЛЖК, в том числе масляной кислоты (бутиратов) - профилактирует заболевания органов пищеварения, снижает диарею, стимулирует развитие рубцовых сосочков и всасывающей способности стенки рубца.

Применение. Для телят с 3-4 дня жизни в молочный и переходный периоды независимо от цели выращивания. Точного дозирования не требуется, скармливается вволю в свободном доступе (ad libitum). Задается в сухие чистые кормушки, меняется ежедневно. Загрязнение корма собственной слюной, мухами или плесенью —отрицательно сказывается на потреблении престартера. В 2-2,5 месяца теленок должен ежедневно съедать не менее 1,5 кг комбикорма.

Схема кормления телят

Возраст теленка	Живая масса, кг	Молозиво, переходное молоко	ЗЦМ Корсико® Латте3	Комбикорма АК, кг		Грубые корма, кг			СВ, кг	Средне-суточный прирост, г
				Престарт	Старт	Сено	Силос	Сенаж		
0-2д	35-40	3Х1,5-2л или 2Х3-4л							0,4	
3д		2Х1,5-2л	1Х1,5-2л	приучение					0,5	200
4д		1Х1,5-2л	2Х1,5-2л	0,1					0,5	300
5-7д		-	2Х2,5л	0,2					0,6	500
2-4 нед		-	2Х3,0л	0,6					0,8	600
5-6 нед			2Х3,5л	0,5	0,5				1,2	800
7-8 нед	80		2Х3,0л		1,2	приучение			1,5	900
9-10 нед			2Х2,0л		1,5	0,2			1,8	1000
11-12 нед	120		2Х1,5л		1,7	0,3	0,5	0,5	2,2	1000
4-й месяц	140				2,0	0,5	1,0	1,0	3,0	900
5-й месяц	170				1,0	0,7	2,0	2,0	3,7	1000
6-й месяц	200				1,0	1,0	3,0	3,0	4,5	1000

Варианты скармливания линейки комбикормов АК для ремонтных телочек:

1) ПРЕСТАРТ с 3-4дн до 6 мес.

2) ПРЕСТАРТ с 3-4дн до 1-2 мес.; СТАРТ с 1-2 мес. до 4-6 мес.

ВАЖНО! Начните предлагать чистую свежую воду одновременно с комбикормом, соблюдая временной промежуток после выпойки молока (ЗЦМ). Потребление воды не только способствует лучшему перевариванию пищи и активному развитию рубца, но и стимулирует большую поедаемость комбикорма. При использовании престартера, исключить из рациона соль, другие кормовые добавки. Не рекомендуется варить, запаривать, осолаживать. Продукцию животноводства после применения престартера комбикорма можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Учитывая ветеринарное благополучие Вашего предприятия, подберем лечебную линейку комбикормов, в составе которых содержаться разрешенные кокцидиостатики.

Упаковка: бумажные мешки, 25 кг.
Срок хранения: 4 мес. со дня изготовления.

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ЗООТЕХНИКА

Проблема	Продукция «Агрокурсив»	Период использования	Дозировка и применение
Нестабильное качество молока, исключение инфицирования теленка через молоко матери различными заболеваниями. Дополнительный доход после перераспределения молока с кормовых на пищевые цели.	ЗЦМ **Корсико®Латте3**	С 3 дн до 2,5 мес	1 кг сухого ЗЦМ смешать с 7л воды t 50С, что дает 8кг молока с содержанием 12,5% сухого вещества. Свежеприготовленную смесь при t 38-40С сразу выпоить телятам. Выпойка по схеме, переход на ЗЦМ постепенный.
	ЗЦМ **Корсико®Латте7**	С 7 дн до 2,5 мес	
	ЗЦМ **Корсико®Латте16**	С 16 дн до 2,5 мес	
Диарея телят	**Корсико®Лигар** *Сухой концентрат для приготовления антидиарейного напитка*	Весь период выращивания молодняка	Растворить содержимое 1 пакета (100 г) в 2л воды (38-42ºС). Выпаивать теленку 2 р в день по 1-2л
Обогащение размола витаминами и минералами	Премикс **ЗП61-1 №53468** Премикс **ЗП62-1 №53469**	0-6 мес 6-18 мес	30-80 г/гол/сут 100-200 г/гол/сут
Обогащение размола кокцидиостатиками, витаминами, минералами, адсорбентом	**ВМК Моновит-6**	0-6 мес	2% (или 20кг на 1 т готового размола, комбикорма)
Дополнение рациона минералами	Лизунцы **«Лизумин»**	Весь период выращивания	В свободном доступе